



Méthode d'élevage avec un rack 16 places à 20 °C



**SI VOUS AVEZ FAIT LE CHOIX DU KIT AVEC INSECTES INCLUS,
CETTE PAGE EST FAITE POUR VOUS!**

(sinon, passez directement à la page 3)

🌊 Dès réception, **placez les 3 boîtes d'insectes dans 3 bacs différents** à température ambiante et déposez une rondelle de carotte (non traitée de préférence) dans chaque bac.

🌊 **Assemblez le rack** en vous aidant de la notice de montage. Installez le dans **un endroit sombre** et fixez le au mur. **Le rack Vertical**, de part sa forme, **doit être fixé au mur**. Si vous possédez des plinthes, une « Cale pour plinthe » est proposée sur le site afin d'en compenser leur épaisseur.

🌊 Lorsque le rack sera installé, vous pourrez placer **le bac substrat fécondé à l'emplacement n° 2**, **le bac de jeunes larves à l'emplacement n° 3**, et **le bac de larves les plus avancées à l'emplacement n° 4**.

🌊 A partir de maintenant, vous devrez être attentif et observer la transformation des larves les plus avancées (emplacement n°4) en **nymphes**. Cette étape peut commencer **dès les premiers jours** de réception de vos insectes.



🌊 Placez les nymphes récoltées sans nourriture sur les coupelles de l'éclosoir et patientez 6 à 13 jours pour voir éclore vos **premiers coléoptères**.

🌊 Vous pouvez à présent suivre les étapes de la page 3 et installer vos jeunes coléoptères **dans un bac de ponte** dans l'emplacement n°1.



Visionnez **“Réception du kit 8 places bois “** sur la chaîne You Tube d’Insectadom.
(Cette vidéo est valable également pour le Kit 16 places)

Les conseils qui suivent sont donnés à titre indicatif. C'est votre expérience, votre région d'habitation et vos envies de tester d'autres méthodes d'élevage qui feront de vous un(e) entomoculteur(trice) d'exception !

L'organisation des bacs par ordre chronologique de 1 à 16 est une proposition. Tout est possible, chacun peut à loisir organiser son élevage comme bon lui semble en fonction de ses envies ou besoins.

1

Bac de ponte

Pour un meilleur suivi, étiquetez vos bacs d'élevage en indiquant la date et un numéro de bac. Retirez l'étiquette avant le lavage d'un bac à l'eau.

Bac de ponte
= grosses mailles



Placez le bac de ponte à l'intérieur d'un autre bac dans l'emplacement n°1

La grille permet d'empêcher les adultes de manger leurs œufs augmentant considérablement la production.

En rythme de croisière, il est conseillé d'y placer 80 gr de coléoptères adultes dans 250 gr de « Nourriture et substrat ». Il est possible d'utiliser du son de blé du commerce en veillant absolument à sa qualité. Il doit être **non traité, et garanti sans pesticides**.

Des objets non traités sont également les bienvenus pour le bien-être des animaux afin de créer des cachettes (Boîtes d'œufs par exemple).



Visionnez “Le bac de ponte” sur la chaine You tube d'Insectadom

Au stade de coléoptère, il est fortement conseillé de mettre à disposition de la nourriture fraîche à raison de **20 gr environ tous les 2 jours** permettant d'apporter une bonne complémentarité hydrique des ténébrions.

Afin d'éviter toute moisissure qui serait fortement délétère, prenez-soin d'**enlever tout reste** subsistant au bout de 2 jours. Les ténébrions ont la capacité de capter l'humidité ambiante et même s'ils semblent se jeter sur la nourriture fraîche, **un excès vous posera des problèmes sanitaires** (moisissure, acariens...)

Privilégiez les aliments « compacts » du type carotte, pomme de terre, navet, radis, choux, pommes, châtaignes crues, salade (non traitée), orties... Les aliments trop « humides » risquent d'agglomérer le substrat et augmenter le risque de moisissure (Exemple tomate, poire...). Avec l'expérience, vous observerez les préférences gustatives de vos protégés et leurs besoins.

Les coléoptères n'aiment pas la lumière.

Ils sont ailés mais ne volent pas.

Il n'y a donc **pas de risque d'évasion**.


Nous vous proposons de **laisser les adultes pondre deux semaines** avant d'effectuer le changement de bac.

Il est possible de raccourcir ce temps à 1 semaine pour avoir des vers plus calibrés en fin de cycle. Dans ce cas, il faut prévoir le doublement de bacs d'élevage.

2

Bac d'élevage

Lorsque les adultes ont pondu durant deux semaines dans l'emplacement 1, placer les rehausseurs entre la grille de ponte et le bac.



Les rehausseurs sont placés de chaque côté

Laissez travailler les insectes! Ils vont, par leurs déplacements, faire passer le substrat fécondé au travers des mailles de la grille. Celui-ci va donc tomber dans le bac inférieur. Utilisez le pinceau en silicone pour accompagner les derniers résidus de substrat éventuellement restés le long des parois. Lorsque le substrat est totalement évacué, **retournez délicatement la grille dans un autre bac** pour récupérer les insectes. Tapotez et utilisez le pinceau en silicone sur la grille afin de décrocher les derniers insectes, d'éventuels œufs accrochés et restes de substrat.

Otez les coléoptères morts et les résidus (ailes, têtes...). Les coléoptères morts sont la première source d'odeur éventuelle de votre élevage. Cette étape est fondamentale et garantit un élevage sain.

Placez ce bac d'élevage dans l'emplacement numéro 2. Il ne faudra que quelques jours pour **observer les premières larves** d'un millimètre à peine.



Préparez un nouveau bac en installant **le bac de ponte dans un bac vide**. Versez les 250 gr de substrat et **installez vos 80 gr de coléoptères** en remplaçant les adultes morts du lot précédent par de jeunes coléoptères issus de votre élevage afin de recréer un lot de 80 gr de pondeurs. Placer ce nouveau bac de ponte dans **l'emplacement 1** à la place du précédent. Si les grilles inox sont lavées, attendre leur complet séchage avant toute réutilisation.

Tout comme le jeu de la chaise musicale, à chaque changement de bac, **décalez tous les bacs d'élevage d'un compartiment** pour laisser la place au bac fraîchement fécondé.

3

Bac d'élevage

A ce stade, rien de spécial n'est à observer à part peut-être les toutes premières éclosions. Les larves sont minuscules et translucides. **Ne pas donner de nourriture fraîche** et laisser le temps opérer.

Les larves consomment du substrat qui leur apporte nourriture et humidité. Continuez à éliminer d'éventuels résidus noirs issus d'adultes morts s'il en reste.

4

Bac d'élevage

Les larves sont bien visibles et ont tendance à se regrouper dans les coins des bacs. La nourriture n'est pas encore de rigueur.

5

Bac d'élevage

Les larves continuent leur croissance, rien à donner à manger à ce stade sauf si vous commencez à voir apparaître un genre de « neige brune » à la surface du substrat. Il s'agit des premières mues.

Vous pouvez commencer à donner un peu de nourriture. 2 gr de légumes-racine à titre indicatif (1 fine rondelle de carotte par exemple). Si le morceau n'est pas consommé entièrement au bout de 2 jours, renouvelez-le en prenant soin de le tapoter pour faire tomber les petites larves accrochées.



Les mues forment une neige brune sur le dessus du bac

6

Bac d'élevage

Augmentez petit à petit la nourriture en passant à environ 4 gr puis 8 gr uniquement si tout est consommé.

7

Bac d'élevage

Observez la consommation de nourriture fraîche et augmentez-la si besoin.

Vérifier s'il est nécessaire de **compléter le substrat**. Les vers vont manger le son et le réduire en une poudre brunâtre. Cette poudre constituée de **déjections** et résidus alimentaires est appelée **Frass**.



Visionnez "**Le tamis**" sur la chaîne You Tube d'**Insectadom**



Le Frass forme une poudre brunâtre dans le fond du bac

N'attendez pas qu'il ne reste plus que cette poudre dans le bac pour rajouter du substrat. Vous pouvez en ajouter 100 gr environ lorsque cela est nécessaire. En fin de cycle, les insectes consomment plus de substrat. Il peut être nécessaire d'en ajouter 100 gr tous les 3 jours. Si tout est consommé en 1 ou 2 jours, il peut être nécessaire de doubler le bac. La ponte de ce lot a été favorable et les larves sont en surpopulation.

8

Bac d'élevage

Continuez à alimenter en nourriture fraîche, régulièrement renouvelée mais sans excès.

Si le niveau de Frass est d'environ **2 cm dans le fond du bac**, mettez-vous dans un endroit bien ventilé (dehors est l'idéal). Placez **le tamis dans un bac vide**.

Versez le contenu du bac de vers dans le tamis, et laissez faire. Les vers, par leurs mouvements vont permettre au Frass d'être trié et de s'évacuer par les mailles fines du tamis. Il faut leur laisser plusieurs heures pour effectuer ce travail. Avec le pinceau en silicone, poussez les derniers résidus de Frass dans le tamis.

Attention, le Frass est très volatile et peut être irritant. Il est donc nécessaire de vous installer à l'extérieur ou de vous protéger avec un masque lors de cette manipulation.



Tamis
= Mailles fines



C'est par ailleurs un formidable engrais naturel à utiliser au potager, verger, pelouse ou dans les plantes d'intérieur. (Voir recette engrais sur le site) Pour des raisons de respect de l'équilibre de la biodiversité et même si le ténébrion est naturellement présent dans nos jardins, Il est **important** de passer ce Frass au four ou au congélateur pour qu'aucun œuf ou ver ne soit relâché en milieu naturel.

Renouvelez les opérations du bac 8 au fur et à mesure des besoins. Il est possible à ce stade de voir apparaître quelques nymphes (Si vous élevez à une température supérieure à 20°, les nymphes apparaîtront bien avant). En général elles sont de petite taille et peu viables. Vous pouvez les éliminer **sans les donner à vos animaux** car la consommation des insectes à ce stade n'est pas conseillée.



Les nymphes sont très fragiles



Continuez les opérations de nourrissage et de complément de substrat.

Si le nombre de nymphes est important, c'est que les larves **commencent à être au bon stade de consommation** soit environ 3 cm de long et 4 mm de large. Vous pouvez commencer à prélever les plus grosses pour les consommer. **Séparez les nymphes** des larves dès que possible afin qu'elles ne soient pas grignotées par leurs congénères, ce qui causerait des malformations au stade adulte.

L'opération de tri à la main peut s'avérer fastidieuse et chronophage.

L'utilisation du bac de séparation est un allié de choix. Lors de son utilisation, et afin d'optimiser le nombre d'opérations d'élevage, voici ce que nous vous proposons :



Placez le tamis dans un bac vide, puis le bac de séparation

Réglez la largeur des fentes en fonction de la taille des nymphes



Visionnez "Le bac de séparation" sur la chaîne YouTube d'Insectadom

Le réglage de la largeur des fentes se fait à l'aide d'un tournevis plat en prenant soin de noter le chiffre du réglage pour les prochaines fois.

L'incidence de quelques dixièmes de mm est importante.

Adaptez le réglage à la taille actuelle de vos nymphes. Leur taille peut varier en fonction de la saison et de l'alimentation apportée. Pour une stabilité optimale, les pieds de la grille de séparation s'encastrent dans les têtes de vis du tamis.

Versez le contenu du bac à trier le plus délicatement possible sur la grille pour ne pas trop brasser le Frass et déposez le bac à trier retourné par-dessus pour emprisonner la poussière lorsque tout est versé.

Et... laissez faire.

Les nymphes vont rester bloquées dans la grille pendant que les vers qui rechercheront à s'enfouir et seront attirés par l'obscurité se glisseront entre les lames de la grille. Les larves vont rester dans le tamis. Le Frass sera récupéré dans le bac inférieur. Le processus peut prendre entre 1 et 2 heures durant lesquelles vous pouvez faire autre chose et laisser les insectes travailler pour vous sans stress.

11

Eclosoir

Pour assurer le renouvellement de votre élevage, il est conseillé de conserver une cinquantaine de nymphes par semaine en sélectionnant les plus belles. (Volumineuses et non tachées)

Placez-les au fur et à mesure dans l'éclosoir.



Visionnez **“L'éclosoir”** sur la chaine You Tube d'Insectadom



Les jeunes coléoptères tombent dans le bac

Toujours à 20°C, elles auront besoin de **6 à 13 jours** pour éclore. Les coléoptères juste éclos tomberont dans le bac situé sous l'éclosoir. Ils sont blancs les premières heures et très fragiles.

Prévoir de vider le bac de récupération **tous les deux jours**, les jeunes adultes ayant besoin de quelques jours avant de s'alimenter, ils ne souffriront pas du manque de nourriture. Si vous avez besoin de vous absenter, verser simplement du substrat au fond pour permettre aux coléoptères d'attendre sagement votre retour.

12

Bac d'attente

En fonction de l'avancement du cycle de votre élevage très conditionné à la température, cet emplacement peut être réservé à un bac d'élevage, à l'éclosoir ou à vos adultes de renouvellement dans un **bac d'attente**.

Déposez une fine couche de substrat et quelques cachettes. Placez-y les jeunes adultes qui prendront des forces le temps d'être ajoutés au bac 1 lors de la mise en place d'un nouveau cycle de ponte.

13

à

16

Emplacements de rangement ou de dédoublement de bacs

Lorsque les conditions sont optimales, il peut être nécessaire de dédoubler des bacs trop chargés (Plus de 500gr). Ces emplacements vous permettront de les entreposer.

Et... La boucle est bouclée. Votre élevage va pouvoir s'autorégénérer et vous pourrez en gérer la taille selon vos besoins en ajoutant du matériel spécifique disponible sur le site.

